

Antalya Şehrindeki Bitkiler 🌸 Plantlife of Antalya City

Filago, Logfia, Evax, Micropus, Bombycilaena, Ifloga, Pseudognaphalium... Gnaphaliinae 2025-01-21b

Keçeotu



Cudweeds (UK), Cottonroses (US)

İletişim iNaturalist Facebook • En yeni PDF • PDF'lar klasörü
Contact iNaturalist Facebook • Latest PDF • PDFs Folder



İçindekiler / Contents :

Antalya Şehrindeki Bitkiler 🌸 Plantlife of Antalya City.....	1
Bazı Özellikler / Some Features.....	1
Hızlı Seçici / Quick Chooser.....	1
Türler / Species.....	2
Filago eriocephala Guss.....	2
Filago germanica (L.) Huds. = F. vulgaris Lam.....	2
Bombycilaena discolor (Pers.) M.Lainz.....	3
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.....	3
Filago pyramidata L.....	4
Filago eriosphaera (Boiss. & Heldr.) Chrtek & Holub.....	4
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. = Filago gallica L.....	5
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L.Burt = Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb.....	5
Micropus supinus L.....	6
Haritalar / Maps.....	6
Benzer Bitkiler / Similar Plants.....	7
Ekstra Kayıtların Anahtarı / Key to Extra Records.....	7
Okuma / Reading.....	7

Bazı Özellikler / Some Features

1. Filago pyramidata	2. Logfia gallica	
Çiçek Kümesi (1. yoğun, 2. açık) Flower Cluster (1. dense, 2. lax)	Çiçek kafa Flower head	Birkaç iplikli çiçek! Several thread-like flowers!
		

Hızlı Seçici / Quick Chooser

Filago eriocephala	Filago pyramidata	Filago eriosphaera	Logfia gallica	Pseudognaphalium luteoalbum	Micropus supinus
					
Bombycilaena discolor	Bombycilaena erecta				
					

Türler / Species

Filago eriocephala Guss.

Deli Keçeotu - Açık ormanlar, boş tarlalar, yol kenarları.

Görüldü Kültür Parkı, Akdeniz Kent Parkı, Boğa Çayı'nın doğusundaki çalılık, Aksu, Varsak Kanyonu, Zeytin Parkı ve yakın güneydoğu, batı ormanlar, Doyran'dan kuzeydoğunda; **kayıtlar** Göynük *INAT.

Dik (1,2,5), **çiçek durumu** olgunlaşmamışken tek yünlü yoğun başlı (2), olgunlaştıkça başın yünü inceler (1,3) ve dallar başın altından uzanır, her dal aynı şekilde başlı (1) (muhtemelen bunlar dallanabilir, ama görülmedi), **çiçek kozalakları** (olgun başlarındaki) belirgin dikenleri yok (3) (mevcutsa sonraki türe bakın), **yaprakları** genellikle biraz dalgalı, hafif yünlü veya yünü neredeyse yok. **Sapkın bir formun** çiçek kümelerinden oluşan bir sütunla görüldü (1a). **Çiçek açar** Mart-Haziran.

Woollyhead Cudweed - Open woods, fallow fields, roadsides.

Seen Kültür Parkı, Akdeniz Kent Park, Boğa Çayı E scrub, Aksu, Varsak Gorge, Zeytin Park & derelict SE of, West Woods, Doyran (NE of); **Records** Göynük *INAT.

Upright (1,2,5), **inflorescence** when immature a single compact woolly head (2), on maturing the wool of the head thins (1,3), and branches extend from under the head each branch likewise having a head that so matures (1) (those conceivably might also branch, but not seen), the **floral cones** (on the mature heads) lack obvious spines (3) (if present see next), **leaves** are usually a bit wavy, slightly woolly to not much. **Mutated form** seen with a column of flower clusters (1a). **Flw** Mar-Jun.



Filago eriocephala Guss. • [PoWo map photos wiki](#)

Filago germanica (L.) Huds. = F. vulgaris Lam.

Alaman Keçeotu - Açık kuru yerler.


Yakındaki kayıtlar Batı ve Kuzey Türkiye.

F. eriocephala'ya (önceki) **benzer**, ama **çiçek konileri** uzun dikenli (2).

Common Cudweed - Dry open spaces.

Records Nearby W&N Turkey.

Similar to F. eriocephala (above) at all stages but **floral cones** have long spines (2).



Filago germanica (L.) Huds. = F. vulgaris Lam. • [PoWo map photos wiki](#)

Bombycilaena discolor (Pers.) M.Lainz

Kısaayaklı -

Görüldü Zeytin Parkı, Düzlerçamı.

Bombycilaena olgunlaşmamışken önceki benzer, ama başları olgunlaştığında yünlü kalır (1-5), birkaç kümeden oluşur, her küme dikensiz (3) birkaç çiçek 'yumurtası'ndan (koniler değil) oluşur.

B. erecta : **Çiçek kümeleri** bembeyaz, kabarık, **çiçek yaprakları** çok yukarıda değil, kenarları dalgasız (1,2).

(Two-Coloured Cudweed)-

Seen Zeytin Parkı, Düzlerçamı.

Bombycilaena when immature are like prior, but **heads at maturity** remain woolly (1-5), formed of a few clusters, each cluster of a few floral 'eggs' (not cones) without spines (3).

B. erecta : **Flower clusters** snowy white, fluffy, **floral leaves** not much above, not wavy-edged (1,2).



Bombycilaena discolor (Pers.) M.Lainz • [PoWo map photos wiki](#)

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.

Diri Kısaayaklı -

Görülecek

Önceki gibi ama **çiçek kümeleri** yeşil beyaz, kabarıklık yok, **çiçek yaprakları** yukarıda, genellikle kenarları dalgalı (1,2).

Upright Cudweed -

To be seen

Like prior but **flower clusters** greenish-white, unfluffed, **floral leaves** rising above, usually wavy-edged (1,2).



Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. • [PoWo map photos wiki](#)

Filago pyramidata L.

Ateşpamuğu - Açık/yanı açık yerlerde taşlı/kumlu toprak.

Görüldü (Kültür Parkı), Zeytin Parkı, Yeşilbayır, şehrin kuzeyi, Varsak, batıdaki ormanlar, Doyran'dan kuzeydoğunda, Çıralı, Geyikbayırı.

Bitki kısa, geniş (1), özellikle çiğnendiğinde (1a), **çiçek durumu** olgunlaşmamışken tek yünlü yoğun başlı (4), olgunlaştıkça başın yünü çoğunlukla kaybolur (3,1) ve dallar başın altından uzanır, her dal aynı şekilde başlı, daha sonra o başlar aynı şekilde dallanabilir (1,2), **çiçek piramitleri** (olgun başlarında) kenarlarında uzun dikenli (3,1,5). **Çiçek açar** (Mart) Nisan-Mayıs (Haziran).

Broad-leaved Cudweed - Stony/sandy soil in open/semi-open places.

Seen (Kültür Parkı), Zeytin Parkı, Yeşilbayır, City N, Varsak, W Woods, Doyran (NE of), Çıralı, Geyikbayırı.

Plant short, wide (1) especially when trampled (1a), **inflorescence** when immature a single compact woolly head (4), on maturing the wool of the head mostly disappears (3,1), and branches extend from under the head, each having a head that may then in the same way branch (1,2), the **floral pyramids** (on the mature heads) have edges with long spines (3,1,5). **Flw** (Mar) Apr-May (Jun).



Filago pyramidata L. • [PoWo map photos wiki](#)

Filago eriosphaera (Boiss. & Heldr.) Chrtek & Holub

Kum Keçeotu - Kumlu toprak, kuru yamaçlar.

Görüldü Zeytin Parkı, Varsak, Düzlerçamı; **kayıtlar** Boğa Çayı'nın deltası 1959 *FOT.

Öncekine (F. pyramidata) **benzer, ama gövdesiz, çiçek dalsız, yün kalıcı, çiçek dikenleri** çok kısa. Bu iki tür, olgunlaşmamışken karıştırılabilir, ama olgun sarı çiçekler görüldüğünde (3), bu farklar açık. **Çiçek açar** Nisan-Mayıs.

Woollyball Cudweed - Sandy soil, dry slopes.

Seen Zeytin Parkı, Varsak, Düzlerçamı; **records** Boğa Çayı delta 1959 *FOT.

Similar to the prior (F. pyramidata) but **stemless, floral branches** do not emerge, **wool** persists, **floral spines** very short. **The two species** could be confused whilst immature but when the mature yellow florets are visible (3) these differences are clear. **Flw** Apr-May.



Filago eriosphaera (Boiss. & Heldr.) Chrtek & Holub • [PoWo map photos wiki](#)

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. = *Filago gallica* L.

Çatal Keçeoğlu - (İnce hafif nemli toprak).

Görüldü Boğa Çayı, Doyran Göleti, Aşağıkaraman'dan doğunda, Düzlerçamı, Varsak Kanyonu.

Ayırt edici, çiçekleri çevreleyen yaprakları çok uzun (1,2), **her yaprak** genellikle dar, sert, grimsi, **çiçek konileri** küme başına birkaç (2,3). **Çiçek açar** (Mar) Nisan-Haziran.

Narrow-Leaved Cudweed - (Thin slightly dampish soil).

Seen Boğa Çayı, Doyran lake, Aşağıkaraman (E of), Düzlerçamı, Varsak Gorge.

Distinctive with **floral leaves** around the flowers very long (1,2), **all leaves** generally narrow, stiff, greyish, **floral cones** few per cluster (2,3). **Flw** (Mar) Apr-Jun.



Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. = *Filago gallica* L. • [PoWo map photos wiki](#)

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L.Burt = *Helichrysum luteoalbum* (L.) Rchb.

Samancıçeği - Nemli yerler (parklar, bahçeler, dere kenarları).

Görüldü Atatürk Parkı ve yakındaki bahçeleri, Batıgar (tramvayın kuzeyinde), Beach Park, Boğa Çayı, Fatih, Kültür Parkı.

Ayırt edici, çiçek başları silindirik, ayrıntı, kenarları şeffaf (3), çiçekçikleri sarı (3), olgunken kırmızımsı (3a). **Çiçek açar** ?Ekim-Haziran (**görüldü** 2,3,5,11,12 ay).

Jersey Cudweed - Moist spots (parks, gardens, streamsides).

Records Atatürk Park and gardens nearby, Batıgar (just N of tram), Beach Park, Boğa Çayı, Fatih, Kültür Parkı.

Distinctive, the **floral heads** cylindrical, separated, sides transparent (3) florets yellow (3), maturing reddish (3a). **Flw** ?Oct-Jun (**seen** 2,3,5,11,12).



Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L.Burt = *Helichrysum luteoalbum* (L.) Rchb. = *Gnaphalium luteoalbum* L. • [PoWo map photos wiki](#)

Micropus supinus L.

Yumakbaş - Açık kuru yerler, yol kenarları.



Görüldü Zeytin Parkı, Doyran, Düzlerçamı.

Bitki alçak, hafif yayılan (1), ipek tüylü (2), **yaprakları** karşılıklı (2), genişimsi, dalgalı (1,1a), **çiçek başları** tek, yaprak tabanlarında (3), **çiçek pulları** sert, çiçeği kapsayan, dikenli tepeli (5,3). **Çiçek açar** Nisan-Haziran (bu fotoğraf Şubat).

Trailing Micropus - Dry open places, roadsides.

Seen Zeytin Park, Doyran, Düzlerçamı.

Plant low, slightly spreading (1), silk-haired (2), **leaves** opposite (2), broadish, wavy (1,1a), **flower heads** solitary, at leaf bases (3), **floral scales** stiff, enclosing flower, spine-crested (5,3). **Flw** Apr-Jun (photo Feb).




Micropus supinus L. • [PoWo map photos wiki](#)


Haritalar / Maps

powo.science.kew.org 'deki haritalar (görmek için bağlantılara tıklayın), yeşil yerel, mor yabancı.
powo.science.kew.org maps (click links to view), green is native, purple alien.

[Pseudognaphalium luteoalbum](#)



[Filago pyramidata](#)



[Logfia gallica](#)



[Micropus supinus](#)




[Filago eriocephala](#)



[Filago eriosphaera](#)



[Filago germanica](#) = *F. vulgaris*











[Bombycilaena erecta](#)



[Bombycilaena discolor](#)



Benzer Bitkiler / Similar Plants

Helichrysum stoechas	Phagnalon graecum	Artemisia verlotiorum	Helichrysum pamphylicum		
					
					

Ekstra Kayıtların Anahtarı / Key to Extra Records

*FOT - "Flora of Turkey and the East Aegean Islands", 11 vols (see below).

Okuma / Reading

Genel Kaynaklar / Standard Resources -

<https://archive.org/download/antalyaplants/bibliography.pdf>
(Flora of Turkey vol 2, Flora Europaea vol 2)

Özel Kaynaklar / Specific Resources -

"Revisión Taxonómica del Género *Bombycilaena* (DC.) Smoljan. (Asteraceae)", 2014
researchgate.net/publication/263973978 (in Spanish)
Santiago Andrés-Sánchez, M. Montserrat Martínez-Ortega, Enrique Rico